


Es procedirà a la seua vacunació al llarg del dia de hui. La vacuna que s'usarà serà la d'AstraZeneca, l'ús de la qual està recomanat per a persones nascudes entre 1956 i 2003, ambdós inclosos.

Aquesta vacuna requereix dos injeccions que s'administraran de forma intramuscular, habitualment en la part superior del braç. Entre l'administració de la primera i la segona dosi hauran de passar aproximadament 3 mesos.

### Contraindicacions o precaucions

Abans de l'administració de la vacuna, per favor, revise el llistat següent i marque si escau en la casella de l'esquerra si compleix algun dels criteris descrits:

	QÜESTIONARI	MESURES QUE CAL ADOPTAR
	Ha patit alguna reacció al·lèrgica greu o immediata a dosis prèvies d'aquesta vacuna o a algun dels seus components com polisorbitat i polietilenglicol?	Contraindicació absoluta.
	Ha passat la COVID19, amb o sense símptomes, en els darrers 6 mesos?	Posposar la vacunació.
	Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu o febre >38°C?	Posposar la vacunació.
	Pateix mastocitosi?	Posposar la vacunació.
	Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables?	Observar 30 minuts.
	Ha rebut alguna vacuna en els darrers 14 dies?	Posposar la vacunació. Es recomana separar la vacuna davant la COVID-19 d'altres vacunes prèvies un mínim de 14 dies.
	Pateix immunosupressió?	Vacunar igualment. La resposta immune pot ser inferior.
	Està rebent tractaments davant la COVID19 (plasma de convalents, anticossos monoclonals o antivírics)?	Posposar la vacunació 90 dies.
	Està rebent tractament crònic amb anticoagulants?	Precisa valoració: Si INR descontrolat, posposar vacunació. Si INR controlat i estable poden rebre la vacunació IM. Pressionar 2 minuts després de la vacunació. Es recomana usar la tècnica en Z per a la injecció.
	Està embarassada? Té pensat quedar-se embarassada?  Està lactant?	Posposar la vacunació. Es recomana esperar a quedar-se embarassada dos setmanes després de la segona dosi. Vacunar i continuar amb la lactància.
	Quina edat té?	Fixar-se en l'edat mínima i màxima recomanada (persones nascudes entre 1956 i 2003)

	<b>FULL INFORMATIU REFERENT A LA VACUNACIÓ DE COVID-19 AMB ASTRAZENECA</b>	Data: 23/03/2021
		Substitueix a: 4/03/2021

### **Beneficis de la vacunació**

L'autorització de les vacunes davant la COVID-19 implica que els beneficis de la seua administració superen amplament els riscos coneguts.

Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir de la tercera setmana després de l'administració de la primera dosi, tot i que com qualsevol altra vacuna potser no protegeix totalment totes les persones vacunades.

La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la rep. L'administració de dos dosis de vacuna reduirà la probabilitat d'emmalaltir, desenvolupar malaltia greu i morir. Tanmateix, les persones vacunades hauran de continuar adoptant les mesures preventives per reduir-ne la transmissió.

### **Reaccions adverses o efectes secundaris**

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas que es presenten, són lleus o moderats i tenen una durada aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions s'inclouen:

- Sensibilitat, dolor i inflamació en la zona de la injecció.
- Fatiga.
- Cefalea.
- Dolor muscular i d'articulacions.
- Febre o calfreds.
- Nàusees.

La vacuna davant la COVID-19 d'AstraZeneca no suposa un augment del risc global d'efectes trombòtics o formació de coàguls en sang.

### **Què cal fer en cas d'una reacció adversa o efecte secundari?**

Si després de la vacunació apareix algun dels efectes enumerats en l'apartat anterior pot utilitzar-se un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com el paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense influir en la resposta immune. Si fora necessari, pot consultar al personal d'Atenció Primària.

Consulte a un servei sanitari si presenta algun d'aquests símptomes: dificultat per a respirar, dolor al pit, inflor o dolor en un braç o una cama; maldecap intens i persistent o que empitjora més de 3 dies després de la vacunació; visió borrosa o doble, múltiples hematomes xicotets (taques vermelloses o violàcies en la pell).

Si la reacció és lleu també podrà notificar-la de forma electrònica a través de l'adreça web [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es) o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del seu apartat enllaços d'interés <Notificació de reacció adversa a medicaments>.

### **Informe de vacunació**

Si es requereix un informe de vacunació, estarà disponible per al seu accés i descàrrega una vegada registrada la vacunació. Aquest informe podrà descarregar-se des de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el subapartat d'*Història de Salut Electrònica*. Per a això és necessari disposar de certificat digital o clau24.

<http://www.san.gva.es/web/portalhse/inicio>